Accréditation Sans Frontières (ASF) ხელსაწყოების ნაკრები 11 · ანტიმიკრობული სტიუარდშიპი · ხელსაწყო 1 5-დან		ASF · ხელსაწყო **AWaRe — Access, Watch, Reserve: მწერლის ჯიბის ბარათი**	
ხელსაწყო	AWaRe — Access, Watch, Reserve: მწერლის ჯიბის ბარათი	**კოდი**	ASF-TOOL-AMS-01
სტატუსი	ადაპტირებული ვერსია	**წყარო**	ASF-ის ხელსაწყოების ნაკრები

ASF · ანტიმიკრობული სტიუარდშიპი · AWaRe ბარათი

ASF · ხელსაწყო · ადაპტირებული ვერსია · https://france-asf.fr/tools/aware-pocket-card/

WHO-ს კლასიფიკაცია, რომელიც გიჩვენებთ, რომელი ანტიბიოტიკი აიღოთ პირველად, რომელი დაიცვათ და რომელი შეინახოთ ბოლოსთვის. მიზანი: მოხმარების მინიმუმ 60% Access ჯგუფიდან.

ACCESS (წვდომა)	WATCH (მეთვალყურეობა)	RESERVE (რეზერვი)
პირველი და მეორე არჩევანი. ვიწრო სპექტრი, დაბალი რეზისტენტობის პოტენციალი. უნდა იყოს ≥ 60% ყველა ანტიბიოტიკის მოხმარებისა.	უფრო მაღალი რეზისტენტობის პოტენციალი. გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივ სახელმძღვანელოში ჩამოთვლილ ჩვენებებზე; გადაიხედება 48–72 საათში.	უკანასკნელი საშუალება დადასტურებული ან სავარაუდო მულტირეზისტენტული ინფექციისთვის. ინიშნება მხოლოდ ინფექციური დაავადებების ან სტიუარდშიპის ავტორიზაციით.
Amoxicillin · amoxicillin-clavulanate · ampicillin · benzylpenicillin · cloxacillin/flucloxacillin · cefalexin · cefazolin · doxycycline · gentamicin · amikacin · metronidazole · nitrofurantoin · trimethoprim-sulfamethoxazole · clindamycin	Ceftriaxone · cefotaxime · cefuroxime · cefixime · ciprofloxacin · levofloxacin · moxifloxacin · azithromycin · clarithromycin · piperacillin-tazobactam · meropenem · imipenem · vancomycin · teicoplanin	Colistin · polymyxin B · linezolid · tigecycline · ceftazidime-avibactam · daptomycin · fosfomycin IV · aztreonam · cefiderocol

1. გავრცელებული ინფექციები — Access-ის პირველი არჩევანი (მოზრდილები, გაურთულებელი; მოარგეთ ადგილობრივ რეზისტენტობის მონაცემებს)

ინფექცია	პირველი არჩევანი	მეორე არჩევანი	ხანგრძლივობა
საზოგადოებრივი პნევმონია, მსუბუქი	Amoxicillin	Doxycycline	5 დღე
ცისტიტი (ქალები)	Nitrofurantoin	Trimethoprim-sulfamethoxazole	3–5 დღე
პიელონეფრიტი, მსუბუქი	Amoxicillin-clavulanate (ორალურად)	Gentamicin ± amoxicillin (IV)	7 დღე
ცელულიტი	Cloxacillin / flucloxacillin	Cefalexin	5 დღე
ფარინგიტი (სტრეპტოკოკი დადასტურებული)	Phenoxymethylpenicillin / amoxicillin	Cefalexin	10 დღე
შუა ყურის ანთება (ბავშვი)	Amoxicillin	Amoxicillin-clavulanate	5 დღე
ქირურგიული პროფილაქტიკა (სუფთა)	Cefazolin, ერთი დოზა 60 წუთში	—	ერთი დოზა
მწვავე ბრონქიტი, გაცივება, ვირუსული ფარინგიტი	ანტიბიოტიკი არ არის	ანტიბიოტიკი არ არის	—

ადაპტირებულია WHO AWaRe კლასიფიკაციიდან და WHO AWaRe antibiotic book-იდან (2022). ადგილობრივი პირველი არჩევანი უნდა დაადასტუროს დაწესებულების ანტიმიკრობულმა კომიტეტმა ადგილობრივი რეზისტენტობის მონაცემებით.

ASF სტანდარტები: სტანდარტი 4 — ანტიმიკრობული სტიუარდშიპი (AWaRe მიღებული; Access წილი იზომება); Priority Practices.