დოკუმენტის კოდი	ASF-TOOL-POSTPARTUM-HAEMORRHAGE-DRILL-CARD-V2
ინსტრუმენტი	მშობიარობისშემდგომი სისხლდენა — წვრთნის ბარათი
კომპლექტი	ინსტრუმენტი 2 / 5 · დედა და ახალშობილი
ლიცენზია	ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0

ინსტრუმენტი 2 / 5 · დედა და ახალშობილი

ASF ინსტრუმენტი · CC BY-NC-SA 4.0

მშობიარობის შემდეგ 500 მლ-ზე მეტი სისხლდენა საათებში კლავს. პირველი ოთხი წუთი, პრეპარატები და დოზები, როლები და ყოველთვიური წვრთნის ჟურნალი.

PPH — სისხლდენა 500 მლ-ზე მეტი მშობიარობის შემდეგ

გამოიძახე · მასაჟი · ოქსიტოცინი · სითხეები · იპოვე მიზეზი

წუთი	რა გაკეთდეს	ვინ
0	დაიძახე დახმარება; ჩაინიშნე დრო; დაიწყე სისხლის დანაკარგის დათვლა (აწონე ტამპონები)	ყველა
0–1	მკაფიოდ მასაჟირე საშვილოსნო; დაცალე შარდის ბუშტი (კათეტერი)	მეანი
1	ოქსიტოცინი 10 IU IM ან IV (თუ ჯერ არ მიცემულა); შემდეგ ინფუზია 20–40 IU 1 ლ-ში 60 წვეთი/წთ	მეანი / ექთანი
2	ორი მსხვილი IV კანიულა; კრისტალოიდი 1 ლ სწრაფად; სისხლის ასაღებად Hb, ჯგუფი და ჯვარედინი შეთავსება	მეორე პირი
3	ტრანექსამის მჟავა 1 გ IV 10 წუთში (დაბადებიდან 3 საათის ფარგლებში; განმეორება ერთხელ 30 წუთის შემდეგ, თუ სისხლდენა გრძელდება)	ექიმი / მეანი
3–5	იპოვე მიზეზი — 4 T: Tone (ატონია) · Tissue (ნაშვილდის შეკავება) · Trauma (რბილი ქსოვილის რღვევა) · Thrombin (შედედების დარღვევა)	ექიმი
5+	საშვილოსნო ჯერ კიდევ ატონიურია: მისოპროსტოლი 800 µg ენისქვეშ, ან ერგომეტრინი 0.2 მგ IM (არ გამოიყენოთ ჰიპერტენზიის დროს); ბიმანუალური კომპრესია; აორტის კომპრესია; ბალონური ტამპონადა	ექიმი
მუდმივად	ჟანგბადი; თბილად ყოფნა; პულსის, წნევის, შარდის მონიტორინგი ყოველ 5 წუთში; სისხლის გამოძახება; მომზადება ოპერაციისთვის ან გადაყვანისთვის	გუნდი

დაუყოვნებლივ ესკალაცია, თუ: სისხლდენა გრძელდება ოქსიტოცინისა და მასაჟის შემდეგ · პულსი > 110 ან სისტოლური წნევა < 90 · დანაკარგი > 1 000 მლ · ადგილზე სისხლი არ არის. გამოიძახეთ უფროსი მეანი / ქირურგი; მოაწყვეთ გადაყვანა თანმხლებით, მოქმედი IV-ით და შევსებული ბარათით.

1. წვრთნის ჟურნალი

წვრთნის თარიღი	სცენარი	დრო ოქსიტოცინამდე	დრო IV სითხეებამდე	დრო TXA-მდე	PPH ყუთი სრულია ☐	გაკვეთილები
					☐	
					☐	

ადაპტირებულია WHO-ს რეკომენდაციებიდან მშობიარობისშემდგომი სისხლდენის პრევენციისა და მკურნალობისთვის (2012, TXA-ს 2017 განახლება).

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — მეანობის გადაუდებელი რეაგირება (გადამოწმების საშუალება: ბარათი, PPH ყუთი, წვრთნის ჟურნალი).

ASF-TOOL-MN-02 · WHO მასალიდან ადაპტირებული · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · უფასოდ იბეჭდება, გამოიყენება და ითარგმნება — შეინარჩუნეთ ASF ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/postpartum-haemorrhage-drill-card/