ASF-TOOL-PRE-SEDATION-ASSESSMENT-V2

# წინასედაციური და წინაანესთეზიური შეფასება

| | |
|---|---|
| **დოკუმენტის კოდი** | ASF-TOOL-PRE-SEDATION-ASSESSMENT-V2 |
| **ინსტრუმენტი** | წინასედაციური და წინაანესთეზიური შეფასება |
| **კომპლექტი** | ინსტრუმენტი 1 / 4 · სედაცია, ანესთეზია და ჰაერგზა |
| **ლიცენზია** | ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0 |

**ინსტრუმენტი 1 / 4 · სედაცია, ანესთეზია და ჰაერგზა**

ASF ინსტრუმენტი · CC BY-NC-SA 4.0

**ASA კლასი, ჰაერგზა, მარხვა, მედიკამენტები, ალერგიები, წინა ანესთეზია — ერთი გვერდი, რომელიც ივსება ყოველ სედაციამდე ან ანესთეზიამდე, ობიექტის ნებისმიერ ნაწილში.**

პაციენტი · დაბადების თარიღი · № · წონა · პროცედურა · თარიღი · შეაფასა

| ASA კლასი | აღწერა | ☐ |
|---|---|---|
| I | ჯანმრთელი | ☐ |
| II | მსუბუქი სისტემური დაავადება (კონტროლირებადი ჰიპერტენზია, კარგად კონტროლირებადი დიაბეტი, მწეველი, BMI 30–40) | ☐ |
| III | მძიმე სისტემური დაავადება (ცუდად კონტროლირებადი დიაბეტი ან ჰიპერტენზია, COPD, BMI > 40, სტაბილური სტენოკარდია, დიალიზზე მყოფი ESRD) | ☐ |
| IV | მძიმე დაავადება, რომელიც სიცოცხლისთვის მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენს (ახლო ხანში მიოკარდიუმის ინფარქტი, სეფსისი, დეკომპენსირებული გულის უკმარისობა) | ☐ |
| V | მომაკვდავი; ოპერაციის გარეშე გადარჩენა არ არის მოსალოდნელი | ☐ |

ჰაერგზა: Mallampati კლასი (I–IV) · პირის გახსნა (თითებით) · კისრის გაწელვა · თირომენტალური მანძილი

ცვალებადი კბილები, პროთეზები, გვირგვინები · წვერი · წინა რთული ჰაერგზა · ხრინვა / ძილის აპნოე

პროგნოზირებული რთული ჰაერგზა? ☐ დიახ → ანესთეზიოლოგი მოწვეული; რთული ჰაერგზის ეტლი საწოლთან (ინსტრუმენტი 3)

| ანამნეზი | პასუხი |
|---|---|
| მყარი საკვები ≥ 6 სთ ☐ · გამჭვირვალე სითხე ≥ 2 სთ ☐ (დედის რძე 4 სთ; ფორმულა 6 სთ) — ბოლო მიღების დრო: | |
| გულის დაავადება, ჰიპერტენზია, დატვირთვის ტოლერანტობა (კიბეზე ასვლა?); ფილტვის დაავადება, ასთმა, მოწევა; დიაბეტი; თირკმლის / ღვიძლის დაავადება; რეფლუქსი; ორსულობა | |
| მედიკამენტები (ანტიკოაგულანტები, ინსულინი, ანტიჰიპერტენზიული, ოპიოიდები, სედატივები) — დღეს შეჩერებული ან მიღებული | |
| ალერგიები (წამლები, ლატექსი, წებო) · წინა ანესთეზიის ან სედაციის პრობლემები (თავად ან ოჯახში: ბოროტთვისებიანი ჰიპერთერმია, გახანგრძლივებული დამბლა) | |

გეგმა: დონე — მინიმალური / ზომიერი / ღრმა სედაცია / ზოგადი ანესთეზია · ვინ ატარებს: _____ · მონიტორინგი: $SpO_2$ ☐ BP ☐ ECG ☐ კაპნოგრაფია ☐ · სარეანიმაციო აღჭურვილობა შემოწმებულია ☐ · სედაციაზე თანხმობა განხილულია და ხელმოწერილია ☐ · სახლში დასაბრუნებელი თანმხლები ორგანიზებულია ☐

წესი: ASA III ან მეტი, პროგნოზირებული რთული ჰაერგზა ან ღრმა სედაცია → ანესთეზიოლოგი. ვინც ახორციელებს სედაციას, არ ასრულებს პროცედურასაც, თუ მეორე გაწვრთნილი პირი პაციენტს უწყვეტად არ აკონტროლებს.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — სედაციისა და ანესთეზიის უსაფრთხოება (გადამოწმების საშუალება: შეფასება ყოველ ჩანაწერში).

ASF-TOOL-SA-01 · WHO მასალიდან ადაპტირებული · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · უფასოდ იბეჭდება, გამოიყენება და ითარგმნება — შეინარჩუნეთ ASF ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/pre-sedation-assessment/