ASF-TOOL-SA-02

# პროცედურული სედაცია — მონიტორინგის ჩანაწერი

| | |
|---|---|
| **პაციენტი · ნომერი · პროცედურა · თარიღი** | \| სედაციის მომწოდებელი · მონიტორი (მეორე პირი) · ოპერატორი |
| **წინასედაციური შეფასება შესრულებულია ☐ (ინსტრუმენტი 1)** | \| |

**ASF · ინსტრუმენტარიუმი · სედაცია, ანესთეზია და სასუნთქი გზები**

ფურცელი A4 · ვერსია 2

**ყოველ ხუთ წუთში — პირველი დოზიდან გაწერის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამდე: ჟანგბადის შეფარდება, პულსი, წნევა, სუნთქვა, სედაციის ქულა და გაცემული პრეპარატები**

| დრო | $SpO_2$ % | პულსი | წნევა (BP) | RR | სედაციის ქულა 1–6 | $O_2$ ლ/წთ | პრეპარატი · დოზა · გზა | ჯამური | მოვლენა / შენიშვნა | ინიციალები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| საწყისი | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +5 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +10 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +15 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +20 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +25 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +30 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +35 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +40 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +45 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +50 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +55 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| +60 წთ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

სედაციის ქულა: 1 — მღელვარე/აგზნებული · 2 — თანამშრომლობს, ორიენტირებულია · 3 — რეაგირებს მხოლოდ ბრძანებებზე · 4 — ენერგიული რეაგირება ხმამაღალ ხმაზე ან შეხებაზე · 5 — ზანტი რეაგირება · 6 — რეაგირება არ არის. მიზანი ზომიერი სედაციისთვის: 3. ქულა ≥ 5, $SpO_2$ < 92 %, RR < 8, ან რეაგირების არქონა → შეწყვიტეთ პრეპარატები, გაატარეთ სასუნთქი გზების მანევრები, მიაწოდეთ ჟანგბადი, გაატარეთ ანტაგონისტი (ნალოქსონი / ფლუმაზენილი) — და ჩაწერეთ.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — სედაციის მონიტორინგი (შემოწმების საშუალება: შევსებული ჩანაწერი; 5-წუთიანი ინტერვალების აუდიტი)

ASF-TOOL-SA-02 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/sedation-monitoring-record/ · გვ. 1