ASF-TOOL-BT-02

გადასხმის რეაქცია — ამოიცანი და იმოქმედე

ASF · ინსტრუმენტარიუმი · სისხლის გადასხმა

ბარათი · ვერსია 2

ცხელება, ციება, ქავილი, ტკივილი, ქოშინი, მუქი შარდი: შეაჩერეთ გადასხმა, დატოვეთ მილი, დარეკეთ და მიჰყევით ბარათს

1. რეაქცია? შეაჩერეთ გადასხმა

ყოველი რეაქციისთვის დაუყოვნებლივ

1. შეაჩერეთ გადასხმა. შეინარჩუნეთ IV წვდომა ღია 0.9 %-იანი ნატრიუმის ქლორიდით, ახალი მილის მეშვეობით.

2. ხელახლა შეამოწმეთ პაციენტის ვინაობა ერთეულთან და ფორმასთან — არევა შეიძლება იყოს მიზეზი.

3. სასიცოცხლო ნიშნები; დარეკეთ ექიმს; დარეკეთ ლაბორატორიაში და აცნობეთ.

4. შეინახეთ ერთეული, მილი და ყველა დოკუმენტი; არ გადააგდოთ.

კატეგორია	ნიშნები	მართვა
მსუბუქი	მხოლოდ ქავილი, ურტიკარია; ტემპერატურის მატება < 1.5 °C სხვა სიმპტომების გარეშე	ანტიჰისტამინი; დაკვირვება 30 წთ; თუ გამოსწორდა — ნელა განაახლეთ მჭიდრო დაკვირვებით; თუ სხვა სიმპტომი გამოჩნდა — მძიმედ მკურნალობეთ
საშუალო	ცხელება ≥ 38.5 ან მატება ≥ 1.5 °C, ციება, შფოთვა, გაწითლება, პულსის მატება, მსუბუქი ქოშინი	ხელახლა არ დაიწყოთ. პარაცეტამოლი; ანტიჰისტამინი; ჟანგბადი საჭიროების შემთხვევაში; გაგზავნეთ ნიმუშები (ქვემოთ); აცნობეთ ლაბორატორიას; სხვა ერთეული მხოლოდ ლაბორატორიის შემდეგ
მძიმე / სიცოცხლისთვის საშიში	ჰიპოტენზია, სუნთქვის გაძნელება, ხვინჭა, გულმკერდის ან წელის ტკივილი, მუქი შარდი, სისხლდენა ადგილებიდან, კოლაფსი, ტემპ. ≥ 39	ანაფილაქსია → ადრენალინი 0.5 მგ IM, ჟანგბადი, სითხეები. ეჭვი ჰემოლიზურ რეაქციაზე → სითხეები შარდის > 1 მლ/კგ/სთ შესანარჩუნებლად, მონიტორინგი, ინტენსიური თერაპია. ეჭვი ბაქტერიულ დაბინძურებაზე → სისხლის კულტურები პაციენტიდან და ერთეულიდან, ფართო სპექტრის IV ანტიბიოტიკი. TRALI → ჟანგბადი, ვენტილაციური მხარდაჭერა. დაუყოვნებლივ დარეკეთ უფროს ექიმზე.

2. ნიმუშები და ანგარიში

პაციენტი: გაიმეორეთ ჯგუფი და ჯვარედინი შერჩევა, პირდაპირი ანტიგლობულინური ტესტი, სისხლის საერთო ანალიზი, შარდოვანა/კრეატინინი, კოაგულოგრამა, შარდი ჰემოგლობინზე; სისხლის კულტურები ცხელების შემთხვევაში. დააბრუნეთ ერთეული და მილი ლაბორატორიაში. შეავსეთ გადასხმის რეაქციის ანგარიში და ინციდენტის ფორმა (ინსტრუმენტარიუმი 8) იმავე დღეს; მძიმე რეაქციები გადადის სენტინელური მოვლენის პოლიტიკასა და ეროვნულ ჰემოვიგილანსის სისტემაში.

დაადაპტირებულია WHO-ს Clinical Transfusion Practice სახელმძღვანელოდან.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — გადასხმის უსაფრთხოება (რეაქციის მართვა და ანგარიშგება); სენტინელური მოვლენის პოლიტიკა

ASF-TOOL-BT-02 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/transfusion-reaction-card/ · გვ. 1